Chirurgia (Bucur). 2010;105(5):673-676

Metastazele la distanţã ale tumorilor maligne ale capului şi gâtului

C. Totan[1], O. Dincã[1], M. Negureanu[2], C. Vlãdan[1], Al. Bucur[1]
[1]Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, U.M.F. "Carol Davila", Bucureşti
[2]Doctorand U.M.F. "Carol Davila", Bucureşti

Rezumat
Studiul retrospectiv realizat pe un numãr de 176 pacienţi internaţi în cursul anului 2006 în Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti, pentru tratamentul unor tumori maligne ale capului şi gâtului a fost iniţiat pe baza înregistrãrilor clinice. Nici unul dintre pacienţi nu a prezentat la primul consult dovezi ale metastazelor la distanţã. Incidenţa globalã a metastazelor la distanţã a fost de 27,84%, variind de la 10,52% pentru interesarea mucoasei jugale, pânã la 63,63% pentru localizarea pelvi-lingualã ($p < 0,05$). O proporţie de 80% dintre metastaze au fost identificate în termen de doi ani de la iniţierea tratamentului. Rata de metastazare a crescut prezentat asociere semnificativã statistic cu stadiul T şi satdiul N. De remarcat cã starea ganglionilor locoregionali a avut o influenţã mai mare asupra ratei de metastazare comparativ cu stadiul T.
Cuvinte cheie: tumori maligne, metastaze, evidare cervicalã

Corespondenţã: Dr. Cosmin Totan, Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, U.M.F. "Carol Davila", Calea Plevnei nr. 17-21, Sector 1, 010221, Bucureşti
E-mail: cosmintotan@gmail.com