Chirurgia. 2011;106(2):251-254

Chistadenomul mucinos apendicular. O dilemã diagnosticã?

E. Kelemouridou, S.AL Mogrampi, G. Tsavis, M. Verroiotou, T. Rallis, I. Fardellas
Surgical Clinic of General Hospital of Naousa Imathia, Greece

Rezumat
Mucocelul apendicular prin chistadenom mucinos este o descoperire clinicã rarã. Aproximativ jumãtate dintre pacienți sunt asimptomatici. Este definit ca dilatație a lumenului apendicular datoratã acumulãrii anormale de mucus la acest nivel. Pseudomixomul peritoneal care este consecința rupturii apendicelui reprezintã complicaåia cea mai gravã. Prezentãm douã cazuri de pacienți care s-au prezentat în clinica noastrã cu simptomatologie diferitã. Primul pacient s-a prezentat cu simptome de apendicitã acutã, în timp ce al doilea prezenta simptome atipice ca dureri abdominale, masã palpabilã în fosa iliacã dreaptã și mucocel apendicular diagnosticat computer tomografic. La ambii pacienți s-a practicat apendicectomie, iar diagnosticul final histopatologic a confirmat prezența chist-adenomului mucinos apendicular care a determinat formarea mucocelului. În concluzie mucocelul este o tumorã rarã, care ar trebui luatã în considerare în diagnosticul diferențial al unei mase tumorale situate în cadranul drept inferior al abdomenului.
Cuvinte cheie: chistademon mucinos, apendice cecal

Corresponding author: E. Kelemouridou M.D.
4 Kivelis Street, Naousa Imathia, Post Code 59200, Greece
Tel.: 00306938676895
E-mail:efikelem@hotmail.com