Chirurgia. 2011;106(2):199-203

Tumorile neurogene ale mediastinului posterior

M. Davidescu, N. Motaș, C. Bluoss, C. Motaș, O. Rus, T. Horvat
Clinica de Chirurgie Toracicã, Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu",
U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti, România

Rezumat
Mediastinul posterior constituie spațiul potențial situat de fiecare parte a coloanei vertebrale, între aceasta şi porțiunile adiacente ale coastelor – şanțurile paravertebrale. Dintre tumorile mediastinului posterior, cel mai frecvent întâlnite sunt tumorile neurogene (75%), restul de 25% sunt reprezentate de un grup heterogen de tumori rare incluzând teratoame, limfoame, sarcoame şi alte leziuni din afara granițelor mediastinale proiectate la acest nivel. Excizia chirurgicalã, prin toracotomie sau miniinvaziv, este prima linie de tratament în tumorile de mediastin posterior. Tumorile cu extensie în canalul medular (tumorile în clepsidrã) ce constituie aproximativ 10% din tumorile mediastinului posterior, necesitã un abord multidisciplinar: chirurg toracic şi neurochirurg. Prezentãm experiența Clinicii de Chirurgie Toracicã în chirurgia tumorilor neurogene a şanțurilor paravertebrale pe o perioadã de 9 ani (2001 – 2010). Sunt analizate 42 de cazuri internate şi operate în aceastã perioadã.
Cuvinte cheie: tumori neurogene, mediastin posterior, tumori în clepsidrã

Corespondență: Dr. Mihnea Davidescu
Str. Sfantul Elefterie, Nr. 19, Sector 5, Bucureæti
E-mail: mihneadav@gmail.com