Chirurgia (Bucur). 2014;109(6):843-845

Tumoră de coliziune apendiculară: chistadenom mucinos și tumoră carcinoidă. Prezentare de caz

D. Dellaportas[1], N.F. Vlahos[2], G. Polymeneas[1], G. Gkiokas[1], C. Dastamani[3], E. Carvounis[3], T. Theodosopoulos[1]

[1]2nd Department of Surgery, Aretaieion University Hospital, Athens, Greece

[2]Department of Obstetrics and Gynecology, Aretaieion University Hospital, Athens, Greece

[3]Department of Pathology, Aretaieion University Hospital, Athens, Greece

Rezumat

Introducere: Chistadenomul mucinous este cea mai comună formă de neoplazie benignă a apendicelui, iar carcinoidul este cel mai comun tip de leziune primară malignă apendiculară. Raportăm cazul rar al unei paciente în vârstă de 57 de ani cu prezență simultană de chistadenom mucinous și tumoră carcinoidă a apendicelui. Neoplazia dual carcinoidă și epitelială este un eveniment rar întâlnit la nivelul apendicelui.

Prezentare de caz: O femeie de rasă caucaziană în vârstă de 57 de ani s-a prezentat la medic după palparea întâmplătoare a unei formațiuni în fosa iliacă dreaptă. Mijloacele imagistice au revelat o tumoră chistică la nivelul fosei iliace drepte cu diametrul de cca. 8 cm, cu originea fie în ovarul drept, fie în apendice. Pacienta a fost supusă explorării laparoscopice chirurgicale, ce a detectat prezența unui mucocel appendicular, procedura finalizându-se cu apendicectomie și excizia unui chist ovarian drept. Examenul patologic a decelat o tumoră de coliziune, constând în chistadenom mucinous și tumoră carcinoidă apendiculară. Datorită dimensiunii și extensiei tumorii carcinoide, revelate de raportul anatomopatologic, pacienta a fost supusă din nou unei explorări chirurgicale și colectomiei drepte laparoscopice.

Discuții: Chistadenomul mucinous este o entitate rară, dar este cea mai frecventă tumoră apendiculară benignă, reprezentând 0,6% din probele operatorii post-apendicectomie. Se poate manifesta similar apendicitei, unui mucocel sau, dacă tumora este ruptă, asemănător unui pseudomyxoma peritonei. Pe de altă parte, carcinoidul este cea mai frecventă leziune malign primară apendiculară și reprezintă 0,3-0,9% din probele operatorii postapendicectomie, cu o ușoară predominanță în rândul sexului feminine. Cazuri rare de prezență simultană a tumorii carcinoide și chistadenomului mucos au mai fost raportate în literatură, dar în cazul acesta a fost vorba de o tumoră de coliziune, între cele două tumori neexistând nicio zonă de tranziție. De asemenea, forma clinică de prezentare a pacientei și necesitatea unui diagnostic diferențial între leziunile ovariene și tumorile apendiculare merită menționate.

Cuvinte cheie: apendice, chistadenom mucos, tumoră carcinoidă, tumoră de coliziune

Corresponding author: Dellaportas Dionysios, MD
2nd Department of Surgery
University of Athens, Aretaieion Hospital
76 Vassilissis Sofias Ave., 11528, Athens, Greece
E-mail: dellapdio@gmail.com