Chirurgia (Bucur). 2015;110(6):565-569

Mucocel apendicular - prezentare de caz și analiza literaturii

Y. Asenov[1], B. Korukov[1], N. Penkov[1], Th. Sedloev[1], V. Tihtchev[2], V. Hadzhiysca[3], D. Damianov[1]
[1]Department of Surgery, University Hospital "Queen Joanna", Sofia, Bulgaria
[2]Department of Pathology, University Hospital "Queen Joanna", Sofia, Bulgaria
[3]Department of Nuclear Medicine, University Hospital "Alexandrovska", Sofia, Bulgaria

Rezumat

Mucocelul apendicular (MA) a fost descris pentru prima oarã de cãtre Rokitansky în 1842. (1) Incidența sa este între 0.2 – 0.4% din totalul apendicectomiilor efectuate și se întâlnește predominant la femei cu un raport de 4/1 comparat cu bărbații, iar cel mai frecvent la vârsta de 50 de ani. (2,3) Vã prezentãm cazul unei paciente de 64 de ani, îndrumatã cãtre investigații amãnunțite dupã un control ginecologic de rutinã. Mucocelul apendicular cu localizare retrocecalã, învelit de membrane Jackson adiționale, a fost descoperit intraoperator. Formațiunea odatã cu apendicele a fost excizatã, fãrã a compromite integritatea mucocelului. Examenul histopatologic a determinat un chistadenom mucinos cu linii clare de rezecție, fãrã alte date sugerând afectarea țesutului apendicular. Pacienta a fost externatã la 3 zile dupã operație fãrã alte complicații, iar urmãtorul control medical este programat la 6 luni.

Cuvinte cheie: mucocel apendicular, celule caliciforme, apendice, tumori producãtoare de mucus