Chirurgia (Bucur). 2016;111(3):230-235

**Chirurgia laparoscopicã a splinei: experienţã acumulatã în Spitalul de Urgenţã Judeţean Baia-Mare, România**

Mihaela Leşe
General Surgery Department, County Emergency Hospital, Baia Mare, Romania

**Rezumat**

*Introducere:* Chirurgia splinei este o chirurgie fãrã anastomoze şi fãrã modificarea circuitelor fiziologice ale organismului; de aceea, diferenţa de mãrime a inciziei în abordul laparoscopic, comparativ cu abordul clasic, determinã principalele avantaje ale chirurgiei laparoscopice: necesar redus de analgezice, rata redusã a complicaţiilor postoperatorii, durata scãzutã de spitalizare şi necesarul redus al transfuziilor de sânge intra- şi postoperator.

*Material şi metodã:* Au fost analizate retrospectiv datele din foile de observaţie a 4 pacienţi operaţi laparoscopic pentru purpurã trombocitopenicã idiopaticã, chist şi abces splenic.

*Rezultate:* Vârsta medie a pacienţilor a fost de 56 de ani, durata spitalizãrii postoperatorii a fost de 4 zile în toate cazurile, durata intervenţiei chirurgicale a fost in medie de 150 de minute şi s-a administrat o singurã unitate de sânge postoperator.

*Concluzii:* Chirurgia laparoscopicã a splinei este realizabilã şi sigurã în experienţa iniţialã a Spitalului Judeţean de Urgenţã Baia Mare, permite recuperarea rapidã postoperatorie a pacienţilor şi conservarea splinei în afecţiunile care afectează parţial parenchimul splenic.

**Cuvinte cheie:** splenectomie laparoscopicã, chist splenic, abces splenic